

‘බේංගු මධ්‍යම්, රට සුරක්ම්’

බස්නාහිර පලාත් බේංගු මර්දන බලකාය

බස්නාහිර පලාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය

සෞඛ්‍ය දෙපාර්මේන්තුව

බස්නාහිර පලාත

බේංගු මර්දනයේ යෙදි සිටින සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතාව දැනුවත් කිරීමේ දී හාවිතා කළ යුතු සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනික පණිවිධි

1. මදුරුවන්ගෙන් තොර නිවාස පරිග්‍රයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා සතියකට පැය $\frac{1}{2}$ ක් වත් නිවස සහ අවට පරිසරය පවිතු කරන්න.
2. නිවස තුළ ඇති ශිතකරණ, මල්බුන්, කුහුණී උගුල් වල බේංගු මදුරුවාන් බිත්තර දුමිය හැකි බැවින් නිතර පරික්ෂා කර පිරිසිදුව තබාගන්න.
3. ගෙවන්න සහ අවට පරිසරයේ ජලය රස්වීය හැකි වැෂිපිහිලි, කාණු, කොන්ක්විට තවුව (Slab) නිතර පරික්ෂා කර ජලය තොරදෙන ලෙස තබා ගන්න.
4. නිවස අවට පරිසරයේ ඇති ඉවතලන වින්, බෙලෙක්ක, ප්ලාස්ටික් හාජන ජලය තොරදෙන ලෙස තබාගන්න.
5. බේංගු මදුරුවන් ද්‍ර්ශ්‍ය කරනුයේ උදය සහ සවස් කාලයේ දී බැවින් එම්මහන් ගැවසෙනවීට සොගෝල්, මිනෝ, පැහිරිනෝල් වැනි මදුරු විකර්ශක ආලේප කරගන්න.
6. උණ සඳහා Paracetamol මාෂය පමණක් නියමිත මාත්‍රාවට හාවිතා කරන්න.
7. උණ සඳහා Aspirin (ඇස්ප්‍රින්) අඩංගු මාෂය, Diclofenac Sodium (වික්ලොගොනැක් සොචියම්), Mefanamic Acid (මොගොන්මික් ඇසිචි), Ibuprofen (ඉබුප්‍රෝගොන්) ආදි NSAIDs කාණ්ඩයට අයත් වන මාෂය සහ Prednisolone (ප්‍රේනිසලෝන්) Dexamethasone (වෙක්සාමෙනසෝන්) යන මාෂය හාවිතයට තොගත යුතුය.
8. උණ සැදී පැය 48 ක් ගතවූ විසස පුර්ණ රුධිර පරික්ෂාවක් (Full Blood count) සිදුකර සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරයකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න.
9. ගර්හනි මවක් හෝ අවුරුදු 60 වැඩි අයකු හෝ දිර්ස කාලීනව ප්‍රතිකාර ලබාගන්න අයකු නම් හෝ උණ සැදී පැය 24 ක් ඇතුළත පුර්ණ රුධිර පරික්ෂාවක් (Full Blood count) සිදුකර සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරයකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න.
10. ඔබට පැය 48 කට වඩා උණ පවති නම් වහාම සුදුසුකම් සහිත වෛද්‍යවරයකු වෙත හෝ රුතුයේ රෝහලක් වෙත යන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා 0112478677 අමතන්න.

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ පණිවිධියකි

නිවසේ සිටින බේංගු ආසාදිතයකු රෙකබලා ගැනීම

1. බේංගු රෝගය විනිස්වය කිරීම සඳහා සිදුකළ ඔබගේ NS1 රුධිර පරික්ෂණ වාර්තාව අනුව ඔබට බේංගු රෝගය වැළදී ඇති බව පෙනී යයි. වහාම වෙවදා උපදෙස් ලබා ගන්න.
2. උණ සඳහා Paracetamol මාශය පමණක් නියමිත මාත්‍රාවට ලබා කරන්න.
3. උණ සඳහා Aspirin (ඇස්ප්‍රින්) අඩංගු මාශය, Diclofenac Sodium (ඩික්ලොනොක් සොයිම්), Mefanamic Acid (මෙලොන්මික් ඇසිඩ්), Ibuprofen (ඉබුප්‍රෝෆ්‍රොන්) ආදී NSAIDs කාණ්ඩයට අයත් වන මාශය සහ Prednisolone (ප්‍රේනිසලෝන්) Dexamethasone (ධෙක්සාමෙන්සොන්) යන මාශය හාවිතයට නොගත යුතුය.
4. රෝගයේ සංකුලතා වලින් ආරක්ෂා විමට දියර කළමනාකරණය (Fluid management) ඉතා වැදගත් වේ. වෙවදා උපදෙස් අනුව දියර වර්ගයන් පානය කරන්න.
5. බේංගු රෝගය උත්සන්න විම වැළකීම සඳහා විවේකිව සිටීම (Bed rest) අත්‍යවශ්‍ය වේ.
6. මුත්‍රා වල තද පැහැය, පිටවන මුත්‍රා ප්‍රමාණය අඩුවීම සහ මුත්‍රා පිටනාවීම, බේංගු රෝගය උත්සන්න විමේ ලක්ෂණයක් විය හැකිය. වහාම වෙවදා උපදෙස් ලබාගන්න.
7. මේ දිනවල ඔබගේ ගේරය තුළ බේංගු වෙරසය පවතින බැවින් ඔබගේ සහ ප්‍රවූලේ සැම මදුරු ද්‍රේශ්‍යනයෙන් වැළකි සිටීම සඳහා සොලෙල්, මිනෝල්, පැගිරිතෙල් ආදී මදුරු විකර්ශක හාවිතා කරන්න.
8. ඔබගේ ගේරය තුළ බේංගු වෙරසය පවතින බැවින් නිදාගන්නා සැම විම මදුරු දුලක් හාවිතා කරන්න.
9. ඔබගේ නිවස ආශ්‍රිතව බේංගු වෙරසය ආසාදිත මදුරුවන් අධිකව ගැවසෙන බැවින් උදේ සහ සවස කාලය තුළ දොර ජනෙල් හොඳින් වසා තබන්න.
10. මදුරු ද්‍රේශ්‍යනයෙන් වැළකීම සඳහා කුඩා දරුවන් හට ඇග වැසෙන සේ ඇදුම් අන්දවන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා **0112478677** අමතන්න.

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ පණීවිච්‍යකි